

醫

方

論

醫方論卷二

小柴胡湯

柴胡

八兩

半夏

半升

人參

甘草

黃芩

生姜

三兩

大棗

十二枚

少陽爲半表半裡之經。邪在表者可汗。邪在裡者不可汗也。邪在表者可吐。邪在裡者不可吐也。邪在裡者可下。邪在表者不可下也。須知此之所謂半表半裡者。乃在陰陽交界。

之所陽經將盡。駸駸乎欲入太陰。營衛不和。陰陽交戰。並非謂表裡受邪。若大柴胡可表。可下例也。仲景嘉惠後世。獨開和解一門。俾後人有所持循。不犯禁忌。蓋和者和其裡也。解者解其表也。和其裡則邪不得內犯。陰經解其表則邪仍從陽出。故不必用汗吐下之法。而陰陽不爭。表裡並解矣。小柴胡湯乃變大柴胡之法。而另出心裁。用人參以固本。又

用甘草姜棗以助脾胃。又用黃芩以清裡熱。使內地奠安。無復返顧之慮。我既深溝高壘。有不戰而屈人之勢。而又用柴胡以專散少陽之邪。用半夏消痰行氣以化逆。譬之自守已固。而又時出遊騎以蹴踏之。使之進無所得。退無所據。有不冰消瓦解者乎。此則仲景立方之微意。非通於神明者不能也。註中凡仲景所加減之方。皆精當不磨。有專治而無

通治此其所以可貴也。學者須細細參之。則於和解一門。思過半矣。

黃連湯

黃連

炒

乾姜

炒

桂枝

甘草

三兩

人參

二兩

半夏

半升

大棗

十二枚

變姜連瀉心之法而爲升降陰陽之法。寒熱並用。補散兼行。和法之最佳者。

黃芩湯

黃芩三兩芍藥 甘草二兩大棗十二枚

古未有治下利之方自仲景立此法以調和腸胃爲主後人踵事而增藥味太多失之龐雜者不免矣。

芍藥甘草湯

白芍藥 甘草炙各四兩

不通則痛腹中不和氣逆而有濁陰此但用甘酸化陰之法而逆氣自消亦高明柔克之

義也。

括萆薢白白酒湯

括萆薢一牧 薢白三兩 白酒四觔

薢白通陽。括萆薢散團結之氣。再加白酒以行氣血。自能消陰翳而開痺結。故不必用辛散耗血之品。以傷至高之元氣也。

溫胆散

陳皮去白 半夏姜製 茯苓 甘草 枳實炒 竹茹

加姜煎

胆爲清靜之府。又氣血皆少之經。痰火擾之。則胆熱而諸病叢生矣。溫胆者。非因胆寒而與爲溫之也。正欲其溫而不熱。守其清靜之故。常方中用二陳竹茹。卽是此意。

逍遙散

柴胡

當歸

酒拌

白芍

酒炒

白朮

土炒

茯苓

錢一

甘草

炙五分

加煨姜薄荷煎

逍遙散於調營扶土之中。用條達肝木宣通
胆氣之法。最爲解鬱之善劑。五臟惟肝爲最
到。而又於令爲春。於行爲木。具發生長養之
機。一有拂鬱。則其性怒張。不可復制。且火旺
則尅。木旺則尅土。波及他臟。理固宜然。此
於調營中。寓疎通條達之法。使之得遂。其性
而諸病自安。加丹參香附二味。以調經更妙。
蓋婦人多鬱故也。

六和湯

砂仁 藿香 厚樸 杏仁 半夏 扁豆
木瓜 人參 白朮 赤苓 甘草 姜棗
扁豆一味。古方多用之。以其有清暑利濕健
脾之功也。予以爲扁苳之性最劣。減去扁苳
人參二味更妙。

藿香正氣散

藿香 紫蘇 白芷 大腹皮 茯苓 三兩

白朮

土炒

陳皮

半夏麴

厚樸

姜製

桔梗

二兩

甘草

一兩

每服伍錢

辟穢祛邪。兼治瘴氣由其芳烈之性。足以勝之。而又兼用化痰利濕之品。以顧脾胃。中州一和。則客邪自解矣。

三解湯

柴胡

麻黃

去節澤瀉

各三錢

一日一作之瘧邪在衛間日一作之瘧邪在

營。二陰大瘧。則邪在腑。皆由先受熱。後受寒所致。故陰陽交爭。內經之訓。昭然如揭。日月。後人紛紛聚訟。各出已見。反致拋荒經義。卽如此方。通治瘧。究竟有損無益。

清脾飲

青皮

厚樸

醋炒

柴胡

黃芩

炒

半夏

姜製

茯苓

白朮

土炒

甘草

炙

草菓

加姜煎

瘧瘧一症。內經論之甚詳。從無一語及臟。可

見瘧邪斷無入臟之理。巢氏病源妄爲分配。識者譏之。清脾飲變小柴胡之製而用黃芩。蓋欲其清營分之熱邪。使之仍從衛出耳。並非病在脾經。清脾以治瘧也。

黃連阿膠丸

黃連一兩茯苓二兩阿膠炒一兩爲末水熬阿膠爲丸

黃連阿膠之法開於仲景但阿膠一味所重

者在井水而不在驢皮。因濟水伏流。惟阿井下通於濟。故有平肝滋腎之功。後來射利之徒。更將牛羊猪犬雜皮一概入膠。敗人脾胃。不如不用爲佳。

姜茶飲

生姜 陳細茶 每末約三錢濃煎服
此亦調和陰陽之法。病輕淺者可用。

蘆根湯

蘆根

一觔

竹茹

一觔

生姜

二兩

粳米

一合

此治熱鬱胃中作嘔作吐則可若云治寒冷傷胃則予不敢深信。

陰陽水

沸湯

井水

各半

鍾和服

此法甚佳極平淡極神奇屢用屢效之方也

甘草黑豆湯

甘草

二兩

黑豆

半升

但稱解藥毒而已。非治之方也。

補中益氣湯

黃芪

蜜炙一錢五分

人參

甘草

炙一錢

白朮

土炒

陳皮

白雷當歸

五分

升麻

三分

柴胡

三分

姜三片

棗二

枚

煎

氣也者。人之所賴以生者也。大氣積於胸中。歸於丹田。呼出則由心達肺。吸入則由肝納腎。無一處不到。無一息或停。故宗氣爲一身。

之主。外護肌表。則爲衛氣。內統血脈。則爲營氣。散布於各臟腑。則爲各臟腑之氣。人能順而養之。則氣平而血亦和。尙何疾病之有。無如七情擾於中。六淫侵於外。斯百變叢生。而鬱氣。逆氣。動氣。滯氣。痞氣。燥氣。寒氣。痰氣。濕氣。水氣。種種氣病。指不勝屈矣。醫者當細心剖晰。對症施治。方免貽誤。汪認菴於理氣門中。首選補中益氣湯。誠以東垣辨內傷外感。

剗切詳明使人於陽虛發熱之症不誤作傷寒妄汗妄下保全無限民命實爲功於千古卽如此方於主治註中治一切清陽下陷中氣不足之症臨後二語明白了當本無謬訛若使東垣遇陰虛發熱及上實下虛之症亦斷不用此方乃不善學者每有先入之見膠執於中一遇發熱不論陽虛陰虛不論上實下實遂謂甘溫能除大熱動輒參芪升柴爲

害非小。醫貫曰。讀傷寒書而不讀東垣書。則內傷不明而殺人多矣。讀東垣書而不讀丹溪書。則陰虛不明而殺人多矣。此誠持平之論也。夫學醫而知宗仰東垣。不可謂非有志之士。然尙不可預有成心。又況峻烈之品。險怪之法。豈可輕試乎哉。

烏藥順氣散

烏藥

橘紅

錢二

麻黃

去節

川芎

白芷

桔梗

枳殼

炒一錢

殭蚕

去絲炒

炮姜

甘草

炙五分

加姜葱煎

中風之症。皆由氣血虧虛。外風乘隙而入。便
當。着。意。調。營。使。風。從。衛。出。又。或。痰。火。內。蘊。外
風。乘。之。便。當。清。營。化。痰。息。風。理。氣。此。方。多。用
升。散。於。養。血。化。痰。二。義。闕。然。與。註。中。治。中。風
等。症。未。爲。合。法。也。

蘇子降氣湯

蘇子 半夏 前胡 厚樸姜炒 橘紅

當歸錢一 甘草炙 肉桂五分 加姜煎

此等方施之於濕痰壅塞中脘不舒者。倘嫌其太燥。乃註中主治虛陽上攻。喘嗽嘔血等症。是益火加薪。吾見其立敗也。

木香順氣湯

木香 草蔻仁 益智 蒼朮二分 厚樸四分

青皮 陳皮 半夏 吳茱萸湯泡 乾姜二分

茯苓

澤瀉分一升麻

柴胡

分一當歸

五分

東垣此方升清降濁使中脘開通極有意義但辛燥太過宜酌用之。

四磨湯

枳櫚

沉香

烏藥

人參

等分濃磨煎

三四沸溫服

四磨湯原爲氣逆喘急而設若用人參不如勿服之爲佳矣除人參加木香枳實者爲宜。

且於氣厥者尤合。

越鞠丸

香附

醋炒

蒼朮

泔浸炒

撫芎

神麴

炒

梔子

炒黑

等分麴糊爲丸

凡鬱病必先氣病。氣得流通鬱於何有。此方
註云。統治六鬱。豈有一時而六鬱並集者乎。
須知古人立方。不過昭示大法。氣鬱者香附
爲君。濕鬱者蒼朮爲君。血鬱者川芎爲君。食

鬱者神麴爲君火鬱者梔子爲君相其病在何處酌量加減方能得古人之意而不泥古人之方讀一切方書皆當作如是觀

七氣湯

半夏姜汁炒 厚樸姜汁炒 茯苓四錢 紫蘇二錢

加姜棗煎

七情受病兼有痰涎一時舉發則有之理氣化痰開解鬱結七氣湯所以爲佳也

四七湯

人參

官桂

半夏

錢一

甘草

分五

加姜煎

越鞠丸治氣實之鬱。四七湯治氣虛之鬱。虛則寒生。不可謂氣病絕無寒症也。備此一法。庶無偏勝之患。

代潁旋覆湯

旋覆花

兩三

代潁石

兩一

人參

兩二

甘草

兩三

半夏

升半

生姜

兩五

大棗

十二枚

汗吐下後中虛氣逆。不可再攻。故用重以鎖之。甘以緩之。辛以散之之法。

丁香柿蒂湯

丁香

柿蒂

錢二人參錢一

生姜

片五

呃逆之症。非一端。若腎氣不收。厥逆而上。頭汗微喘。當用大劑參附。以收攝真陽。此治連珠發呃之要法。非丁香柿蒂等所能勝任也。若因寒犯胃。氣鬱而呃者。則此方爲宜。丹溪

乃以相火上衝之呃爲辭。豈呃逆之症。但有
火呃。竟無寒呃乎。是又過當之談矣。

橘皮竹茹湯

橘皮 竹茹 人參 甘草 半夏 麥冬

赤苓 枇杷葉 加姜棗煎

此則治痰火之呃。而不可以治胃寒之呃。若
誤用之。則輕者增劇。

定喘湯

白朮

二十炒黃

枚麻黃

半夏

姜製

款冬花

三錢

桑皮

蜜炙

蘇子

二錢

杏仁

去皮尖

黃芩

一錢五分

甘草

一錢

加姜煎

治痰先理氣不為疏泄則膠固不通此定喘用麻黃之意也。

四物湯

當歸

酒洗

生地

三錢

芍藥

二錢

芩薊

一錢五分

血之取義一為榮榮者發榮也非血則無以

潤臟腑。灌經脈。養百骸。此滋長之義也。一爲營。營者。營壘也。非血則無以充形質。實腠理。固百脈。此內守之義也。水穀之精。聚於中焦。受氣變化。然後成血。日生幾何。不知調養。而反行耗散。血病多多矣。或目睛流血。耳中出血。鼻中衄血。口中吐血。舌痛出血。牙宣出血。毛竅出血。小溲溺血。大便瀉血。或崩漏。或痔漏。或蓄血如狂。或血痞作脹。或經閉不通。或

妄行血脫。以至跌撲之傷。血瘡瘍之潰。血病
既種種不同。治病之法。或補之。或養之。或涼
之。或溫之。或散之。或破之。立方須一一對症。
理血門。以四物湯爲主方。藥雖四味。而三陰
並治。當歸甘溫養脾。而使血有統。白芍酸寒。
斂肝。而使血能藏。生地甘寒滋腎。而益血。川
芎辛溫通氣。而行血。調補血分之法。於斯著
矣。乃或有譽之太過。毀之失實者。不可以不

辨也。譽之過者。謂能治一切亡血及婦人經病。夫亡血之症。各有所由起。此方專於補血。滋腎而已。無他手眼。不溯其源。而逐其流。豈能有濟。至婦人經病。多有氣鬱伏寒痰塞等。正未可以陰寒之品。一概混投。此譽之太過也。毀之失實者。謂川芎一味辛散太過。恐血未生而氣先耗。殊不知亡血之人。脾胃必弱。若無川芎爲之使。則陰寒之品。未能滋補而。

反。以。礙。脾。此。毀。之。失。實。也。至。精。求。之。以。爲。凡。
治。血。症。當。宗。長。沙。法。兼。用。補。氣。之。藥。無。陽。則。
陰。無。以。生。此。論。最。確。又。恐。執。定。有。形。之。血。不。
能。速。生。無。形。之。氣。所。當。急。固。遂。至。補。氣。之。藥。
多。於。補。血。是。又。矯。枉。過。正。反。坐。拋。荒。本。位。之。
失。矣。此。愈。不。可。不。知。也。

當歸補血湯

黃芪

炙一兩

當歸

酒洗二錢

空心服

歸脾湯

當歸補血湯。黃芪多於當歸五倍以之專治氣分。尚恐滿中。若云養血則輕重尚宜斟酌。

人參 白朮

炒 茯神

棗仁

炒 龍眼肉 二錢

黃芪

炙一錢五分

當歸

酒洗一錢

木香

甘草

炙五分

遠志

一錢

姜棗煎

歸脾湯專治心脾陰中之陽藥。故不用地黃白芍。後人加作黑歸脾。殊失立方之旨矣。

養心湯

黃芪蜜炙 茯苓 茯神 當歸酒洗 半夏麴

川芎一兩 甘草炙 柏子仁去油 酸棗仁炒

遠志去心 五味子 人參 肉桂二錢五分 每服五錢

方中心經藥為多而其餘佐使亦能配合引

入心臟故專以養心為名製方極有意義

人參養營湯

人參 白朮 黃芪蜜炙 甘草炙 陳皮 桂心

當歸

酒拌一錢

熟地

五味子

炒

茯苓

七分

遠志

五分

白芍

一錢五分

加姜棗煎

此實三陰並補氣血交養之劑。註中但言治脾肺兩經。未免掛漏。論者但議其及肺與不及肺抑末也。

龍腦鷄蘇丸

鷄蘇葉

一兩六錢

生地黃

六錢

麥冬

四錢

蒲黃

炒

木通

阿膠

炒

銀柴胡

二錢

甘草

五分

黃芪

人參

人參

人參

先將木通柴胡浸二日熬汁地黃浸汁熬膏
再加蜜三兩煉過和丸

清鬱熱而瀉濕火。此方最佳。惟近日之阿膠
斷不可用。柴胡黃芪再爲酌減。斯盡善矣。

咳血方

青黛

水飛

括蕁仁

去油

海石

炒黑

山梔

炒黑

訶子肉

等分爲末蜜丸噙化嗽甚加杏仁

咳嗽痰血固屬君相之火犯肺。此方但清火

而。不。治。血。乃。去。所。擾。則。自。安。之。義。然。業。經。失。血。則。肺。已。大。傷。豈。可。置。之。不。論。不。議。去。訶。子。而。加。清。養。肺。陰。之。藥。始。爲。得。之。

獨聖散

白芨 爲末每服二錢臨卧糯米湯下

肺壞能補。惟有白芨。此獨聖之所以得名也。

清咽太平丸

薄荷 十兩

川芎

防風

犀角

柿霜

甘草二兩 桔梗三兩 蜜九

於清涼中。寓升散之法。非特火鬱則發之。亦非此不能清解上焦也。

還元水

童便 取十一二歲無病童子。不如葷辛清徹如水者。去頭尾熱。飲冬則用湯溫之。或加藕汁和服。

童便乃真陰。又無嗜慾。以之滋腎降火。誠治

血之妙品

麻黃人參芍藥湯

桂枝

五分

麻黃

黃芪

甘草

炙

白芍

各一錢

人參

三分

大麥冬

三分

五味子

五粒

當歸

五分

熱服

麻黃人參湯。非教人補中。當用散藥。正教人散中。當用補藥也。氣血虧弱之人。易受外感。風寒深入。不得不爲表散。若往用麻桂等湯。發汗後。虛陽欲絕矣。東垣立此方。以治虛人。

之表病。天下後世。可知固本治標之法矣。

犀角地黄湯

生地黃

一兩五錢

白芍

一兩

丹皮

犀角

二錢五分

每服五錢

犀角。化斑解毒。涼血清心。又能引地黃直達
腎經。壯水制火。故吐衄症中多用之。然治心
腎則有餘。而非肺肝之正藥。若治衄血等不
如■羊角之效。至謂升麻可代犀角。則其說

尤。謬。既。有。鬱。火。再。加。風。藥。逼。血。上。升。不。旋。踵。而。敗。矣。

桃仁承氣湯

桃仁

五十粒去皮尖研

大黃

四兩

芒硝

甘草

桂枝

兩

此方準繩以爲當用桂。喻西江等以爲當用枝子。則以爲主治註中有外症不解一語。此四字最宜着眼。有桃仁大黃芒硝甘草以治

裡必當用桂枝以解表仲景立方固無遺漏也。

抵當湯

水蛭

三十個猪脂熬黑

蝨虫

三十個去頭足翅

桃仁

二十去皮尖研

大黃

四兩酒浸

此症雖瘀熱結於少腹極陰之處不得以裡症名之蓋膀胱乃太陽本經之病非由太陽傳裡之症但水蛭蝨虫二味人不敢用即代

抵當丸。尙嫌其太峻。

槐花散

槐花

炒

側柏葉

杵

荆芥

炒

枳殼

炒

等分爲末

每三錢米飲下

陳修園云五臟各有守經之血六腑無血試看猪羊腸胃中豈有一絲一點之血世人謂巨口吋紅爲胃血者妄也此說頗有識解惜其但見得一層尙遺漏一層予特申明之夫

五臟主藏故各有守藏之血六腑主傳故無
守腑之血方其無病之時胃中納水穀大小
腸傳糟粕腸胃中本無血也血但流灌於腑
外以榮養之經所謂洒陳六腑此一語不得
滑口讀過迨至火勢衝激或濕熱薰蒸逼血
入於腑中腑不能容隨受亦隨出矣故血淋
尿血血之由小腸而出者也瀉血痔血血之
由大腸而出者也大小腸既有血症而胃獨

無血症。育是理乎。胃經之血。隨火上升。直從
食管而出。往往盈碗盈盆。至內傷之血。則中
肺經氣管而出。自是兩途。故胃血易治。肺血
難治。數千年來。從未有將無血而有血之故。
徹底發明者。子故因論槐花散一方。而詳及
之。○槐花散。寒涼太過。腸風下血。中氣必虛。
再用陰寒血更凝結。方中去柏葉。加參朮當
歸。陳皮甘草。庶有瘳乎。

秦艽白朮

秦艽

白朮

歸尾

酒洗

桃仁

研一兩

枳實

麴炒

皂角子

燒存性

澤瀉

錢五

地榆

錢三

麴糊丸

凡痔漏之疾多起於濕熱下注。然又有本體陰虛者。一味去風燥濕。反致劫陰。况照皂角子者。令人每發眩暈。此方立意雖佳。然陰虛者。未可輕投也。

芍藥湯

芍藥

兩

歸尾

黃芩

黃連

錢五

大黃

錢三

木香

枳櫛

甘草

錢炙二

桂

錢一

錢五分

此即通因通用之法。濕熱鬱蒸，氣血瘀壅，故下利而後重。行血理氣，則血止而後重自除矣。

蒼朮地榆湯

蒼朮

洪浸炒三兩

地榆

炒黑一兩

每一兩煎

一燥濕。一涼血。亦治下利之正法。然止此二

味尚未足以扶土和榮也。

小薊飲子

小薊

蒲黃

炒黑

藕節

滑石

木通

當歸

生地黃

梔子

炒

淡竹葉

甘草

各五分

清心與小腸之熱，滋腎水而通膀胱，自可以治淋而止痛。

復元羌活湯

柴胡

錢五當歸

括藎根

川山甲

炮二錢

甘草

紅花

二錢

桃仁

五十去

大黃

一兩

酒浸

每服一兩加

酒煎

治跌撲損傷之法。破瘀第一。行氣次之。活血。生新。又次之。此方再加一二味行氣之藥。更佳。

小續命湯

防風

二錢

桂枝

麻黃

杏仁

去皮尖炒研

芍藥

酒洗

白芍

酒炒

人參

甘草

炙

黃芩

酒炒

防已

分八

附子

分四

每服

三錢

加姜棗煎

天地之氣鬱而必宣。風也者。乃大塊噫氣鼓
盪萬物者也。然有和風。有烈風。有怪厲之風。
有微柔之風。和風則不疾不徐。人縱感之。不
爲大害。烈風則咸知畏避。受者反少。怪厲之
風。本不常有。惟微柔之風。最易中人。微則難
防。柔則善入。虛人腠理不密。外風乘隙而投。
由表及裡。病亦由淺入深。前於醫醇賸義中。

已將中絡中經中腑中臟之症。縷晰條分。茲不復贅。但於各方後。竊附管見。小續命湯。乃治六經中風之通劑。方中補氣血。去風寒。清濕熱之藥俱備。非各分門類之專方。易老加減法。亦不過示人以用藥之大凡。至於八腑八臟之症。則固未嘗議及也。

侯氏黑散

菊花

四十
分

防風

白朮

十分

桔梗

八分

人參

茯苓 當歸 川芎 乾姜 桂枝 細辛

牡蠣

礬石

分三右

末用溫酒調方寸七服二

十日再冷服四十日共六十日止則藥積腹

中矣

此方佳處全在平肝息風內風不動則不與外風勾結此便是阻截之法喻西江盛稱其用牡蠣礬石堵禦之妙予請爲進一解當實衛氣以爲城垣當養榮血以堅壁壘若使藥

積腹中以為堵截。吾恐風不得入者。氣血亦由此不通。無怪誤解填塞空竅者之滋議也。

大秦芫湯

秦芫 石膏 三兩 當歸 酒洗 白芍 酒炒 川芎

生地 酒洗 熟地 白朮 土炒 茯苓 甘草 炙 防風

黃芩 酒炒 羌活 獨活 白芷 一兩 細辛 五錢 每服

一兩

此方。劉宗厚與喻嘉言俱謂其風藥太多。不

能養血益筋骨。汪詎菴又謂。用此方者。取效甚多。各執一見。予謂方中四物咸備。不可謂無血藥也。若中風初起。表邪重者。用之尙可取效。然石膏細辛二味。必須減去。

三生飲

生南星

一兩

生川烏

去皮五錢

生附子

去皮五錢

木香

二錢

每服一兩。加人參一兩煎。

邪之所湊。其氣必虛。是也。然邪往從之。虛處

轉實又何說耶。東垣謂中風非外風乃本氣自病太屬偏執。此等峻猛之藥雖有人參氣虛者能任受耶。如喻嘉言之加減爲宜。

地黃飲子

熟地黃

巴戟

去心

山茱萸

肉蓯蓉

酒浸

附子

炮

官桂

石斛

茯苓

遠志

麥冬

石菖蒲

五味子

等分每服五錢八薄荷

少許姜棗煎服

清肝氣以益水之源。納腎氣以制火之僭。水能涵木。孤陽不升。則心氣通。而舌瘖自解矣。惟足癱不能行。尙當加壯筋利節之藥。至其不用風藥。正恐以風助火。故特爲進去。未可議之也。

順風勻氣散

白朮

二錢

烏藥

一錢五分

人參

天麻

五分

沉香

磨三分

白芷

蘇葉

木瓜

青皮

甘草

炙

加姜

煎

順風勻氣。全是氣分藥。並無活血舒筋之藥。以之順氣疎風則可。若治半身不遂。口眼喎斜。當加血藥舒筋爲是。

稀莧丸

稀莧草 以五月五日七月七日九月九日採者佳。不拘多少。揀去粗莖。留枝花莖。實酒拌蒸晒九次。蜜丸。

稀莖之性。一味搜風逐濕。若風濕相搏。腿足
麻痺。及諸濕瘡皆可用。以治中風喎僻。徒益
之燥耳。

牽正散

白附子 僵蚕 全蠍 等分爲末 每二錢

酒調服

但口眼喎邪。而別無他症。則經絡臟腑。均未
受傷。乃太陽陽明兩經之風痰蘊熱所致。三

藥直走內絡。祛風化痰。極爲得力。故不必加血藥也。

如聖散

羌活 防風 白芷 柴胡 甘草 黃芩

半夏 川芎 芍藥 當歸 烏藥

加薑煎入薑汁。竹瀝服。柔痙加白朮。桂枝。剛痙加蒼朮。麻黃。口噤。咬牙。大使實。加大黃。活血去風。化痰清熱。剛柔二痙。加減亦有法。

此節菴方之佳者。

獨活湯

獨活 羌活 防風 細辛 桂心 白微

當歸 芎藭 半夏 人參 茯神 遠志

肉 菖蒲 五錢 甘草 炙二錢 每服一兩加姜

棗煎

此以息肝風爲第一義。養心神次之。化痰清熱又次之。方法極有條理。

活絡丹

川芎

地云
膽反

草烏

地云
皮去

胆星

六兩

地龍

洗焙乾

乳香

去酒

沒藥

另研三錢

酒丸

藥力頗峻。果有頑痰死血。則可用。若寒濕流筋。及血不養筋者。不可誤投。

消風散

荆芥

陳皮

去白

厚朴

姜汁炒

甘草

炙五錢

防風

羌活

藿香

僵蚕

洗炒

煅蛻

川芎

人參 茯苓二兩爲末母服三錢茶湯下
風熱上攻治當清解過用辛散是發風助火
矣殊非正法也

清空膏

黃芩酒炒 黃連酒炒 防風一兩 柴胡七錢 川芎五錢

甘草炙一兩 爲末每服三錢茶調

如膏白湯送下如少陰頭痛加細辛太陰頭
痛脈緩有痰去羌活防風川芎甘草加半夏

如偏頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半
加柴胡一倍如自汗發熱惡熱而渴此陽明
頭痛只與白虎湯加白芷

此則寓清涼於升散中爲治風熱之大法若
陽明頭痛少陰厥痛血虛頭痛又當別用方
法矣

胃風湯

人參

白朮土炒茯苓

當歸酒炒芎藭

桂炒

芍藥

酒炒

等分加粟米百餘粒煎

東垣胃風湯

升麻一錢二分麻黃

不去節一

錢白芷一錢二分葛根一錢柴胡五分羌活

五分藁本五分蒼朮五分蔓荊五分草薢五

分黃柏五分當歸五分炙甘草五分加姜棗

煎

易老胃風湯。養血柔肝。補脾和胃。並無一味。風藥而治法特妙。蓋緣肝木太旺。動而生風。

犯胃尅脾故見飧泄腸風等症但須肝木一
和則內風自息若東垣之胃風湯純用風藥
且燥亦太過不及遠矣

上中下通用痛風丸

川芎

雨一

黃柏

酒炒

蒼朮

洗

南星

姜製

二兩

桃仁

去皮

神麴

炒

防已

白芷

雨一

羌活

威靈仙

酒拌

三錢

龍胆草

雨一

桂枝

錢三

紅花

錢二

麴糊

丸

此於風寒濕之外又兼治痰與血丹溪原自

謂通劑。不過舉此以示大法。病有專在何經者。必須對症立方。不得用此通共之劑。反傷無病之處也。

史國公藥酒方

羌活

防風

白朮

土炒

當歸

酒洗

川牛膝

酒浸

川草薢

杜仲

姜汁炒

松節

并

虎脰骨

酥炙

鱉甲

酥

晚蚕沙

炒二兩

秦艽

蒼耳子

炮

槌碎

四兩

拘杞

五兩

茄根

八兩蒸熟

爲粗末

絹袋盛

浸無灰

酒三十觔煮熟退火毒服每日數次常令醺醺不斷

此酒祛風利濕頗有力於實症爲宜若氣虛者當加補氣藥血虛者當加補血藥

蠲痺湯

黃芪

蜜炙

當歸

酒洗

赤芍

酒炒

羌活

防風

片子薑黃

酒炒

甘草

炙

加姜棗煎

營衛不虧風何由八不調營衛而多用風藥

者。非。升。痰。卽。助。火。此。方。營。衛。兼。顧。而。又。能。祛。風。利。濕。痺。症。中。之。善。方。也。

三痺湯

人參 黃芪 茯苓 甘草 當歸 川芎

白芍 生地黃 杜仲姜汁炒 桂心 川牛膝

川續斷 細辛 秦艽 川獨活 防風

等分加姜棗煎

峻補氣血而祛風除寒利濕之法。悉寓乎其

中。本未兼該。誠治痺之上策也。

獨活寄生湯

獨活 桑寄生 秦艽 防風 細辛

當歸 酒洗 芍藥 酒炒 川芎 酒洗 熟地 酒洗 杜仲 姜汁炒

牛膝 人參 茯苓 甘草 桂心 等分

每服四錢

獨活取其獨立不搖。不須依傍。寄生取其附木而生。大得依傍。二者相濟。又能利筋節而

祛風再兼平補營衛疎通寒濕。用意頗爲周到。

沉香天麻丸

羌活

錢五

獨活

錢四

沉香

益智仁

川烏

二錢

附子

炮

天麻

防風

半夏

錢三

當歸

甘草

殭蚕

錢一

每服

五錢

姜

三片煎

以之治風寒痰厥則可。若因風化火兼有痰涎者。斷不可用。

通頂散

藜蘆

甘草

生用

細辛

人參

川芎

一錢

石膏

五錢

爲末用一字吹入鼻中有嚏者肺

氣未絕可治

不過欲其通陽開竅耳。然太覺煩瑣不如皂
筴散之便捷也。

烏梅擦牙關方

烏梅

揩擦牙齦涎出卽開

木旺則尅土。木燥則筋急。泄木緩筋。則土鬱
自開矣。

醫方論卷二終

醫方論

卷二

美